

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ИППП. СИФИЛИС»**

Выберите правильный ответ

1. В триаду Гетчинсона (признак позднего врождённого сифилиса) не входит:

- а) специфический лабиринтит;
- б) диффузный кератит;
- в) зубы Гетчинсона;
- г) сифилитическая пузырчатка.

2. К атипичным формам твёрдого шанкра не относят:

- а) язвенный твёрдый шанкр на коже головки полового члена;
- б) индуративный (уплотнённый) отек;
- в) шанкр-амигдалит;
- г) шанкр-панариций.

3. Для вторичного активного сифилиса характерны:

- а) медленное разрешение элементов сыпи при лечении;
- б) элементы сыпи не заразны;
- в) полиморфизм высыпаний;
- г) наличие островоспалительной реакции и болезненность сифилидов.

4. Какое из перечисленных заболеваний относят к собственно венерическим?

- а) хламидиоз;
- б) трихомониаз;
- в) сифилис;
- г) чесотку.

5. Укажите клинические признаки, характерные для активного вторичного сифилиса:

- а) сифилитическая ангина;
- б) наличие бугорков и гумм;
- в) наличие диффузной папулезной инфильтрации.

6. К осложнениям твердого шанкра не относят:

- а) индуративный отек;
- б) фимоз;
- в) фагединизм;
- г) гангренизацию.

7. Укажите признаки твердого шанкра:

- а) плотный инфильтрат в основании эрозии или язвы;
- б) отсутствие субъективных ощущений;
- в) медно-красный цвет;
- г) наличие эрозии или язвы;
- д) все перечисленное верно.

8. Для твёрдого шанкра характерно всё, кроме:

- а) отсутствия его болезненности;
- б) обнаружения в отделяемом язвы бледной трепонемы;
- в) отсутствия острого воспаления первичной сифиломы;
- г) всегда положительной реакции Вассермана (RW).

9. Дифференциальную диагностику твердого шанкра проводят со следующими заболеваниями:

- а) мягким шанкром;
- б) простым пузырьковым лишаем;
- в) язвами другой этиологии;
- г) вульгарной эктимой;
- д) со всеми перечисленными.

10. Твёрдый шанкр не дифференцируют с:

- а) туберкулезной язвой;
- б) чесоточной эктимой;
- в) псориазом;
- г) плоскоклеточным раком кожи.

11. Первичный период сифилиса не проявляется:

- а) эрозией;
- б) бугорком;
- в) язвой;
- г) лимфаденитом;
- д) лимфангитом.

12. Третичный период сифилиса при классическом течении развивается:

- а) на 1 - 2 году после инфицирования;
- б) чаще на 2 - 3 году от момента заражения;
- в) через 4 -5 лет от момента заражения;
- г) через 10 лет от момента заражения;
- д) всегда через 15 лет от момента заражения.

13. Папулезные сифилиды слизистых оболочек чаще характеризуются:

- а) четкими границами;
- б) отсутствием периферического воспалительного ободка;
- в) заразительностью;
- г) чаще безболезненные;
- д) всё перечисленное верно.

14. Сифилитическую лейкодерму следует отличать от:

- а) витилиго;
- б) отрубевидного лишая;
- в) псориаза;
- г) красного плоского лишая;
- д) всего перечисленного.

15. Для постановки диагноза «сифилис первичный серопозитивный» необходимо иметь следующие данные:

- а) тщательно собранный половой анамнез;
- б) выявить у пациента регионарный лимфаденит;
- в) обнаружить бледную трепонему в отделяемом из эрозии или язвы;
- г) выявить положительные серологические реакции (РМП, РВ, РИФ, РПГА);
- д) всё перечисленное верно.

16. К разновидностям пустулезного сифилида относятся:

- а) импетигиозный;
- б) эктимоподобный;
- в) рупиоидный;
- г) оспенновидный;
- д) всё перечисленное верно.

17. Дифференциальную диагностику пустулёзного сифилида проводят:

- а) с простым герпесом;
- б) вульгарной эктимой;
- в) псориазом;

г) красным плоским лишаем.

18. При сгруппированном бугорковом сифилиде язва:

- а) с некротическим стержнем на дне;
- б) округлой формы с плотными валикообразными краями;
- в) образует плотный звездчатый рубец;
- г) всё перечисленное не верно;
- д) всё перечисленное верно.

19. Сифилитические гуммы чаще поражают:

- а) голени и верхние конечности
- б) волосистую часть головы
- в) кожу спины
- г) всё перечисленное не верно
- д) всё перечисленное верно.

20. Укажите клинические формы гуммозного сифилида:

- а) гуммозный инфильтрат;
- б) фиброзные гуммы (околосуставные узловатости);
- в) изолированные гуммы;
- г) все перечисленное верно.

21. Укажите признаки фиброзных гумм.

- а) локализуются на передней и задней поверхности суставов;
- б) являются результатом перерождения сифилитической гуммы;
- в) сопровождаются регионарным лимфаденитом;
- г) верно 1 и 2.

22. Гуммозный сифилид дифференцируют:

- а) с псориазом;
- б) лепрой;
- в) алопецией;
- г) пузырьчаткой.

23. К нетрепонемным тестам относят все перечисленные, кроме:

- а) RPR;
- б) микрореакции преципитации;
- в) VDRL;
- г) РИТ.

24. Сифилис на латинском языке

- а) pestis;
- б) scabies;
- в) lues;
- г) lupus.

25. Основной путь заражения сифилисом

- а) воздушно-капельный;
- б) бытовой;
- в) контактный;
- г) половой.