

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«Первая медицинская помощь при кровотечениях»



1. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь красного цвета, сочится из раны вследствие ссадин, неглубоких порезов; останавливается быстро из-за высокой свёртываемости крови?

- 1) капиллярное;
- 2) венозное;
- 3) артериальное;
- 4) паренхиматозное.

2. Какое из кровотечений является самым опасным?

- 1) капиллярное;
- 2) внутреннее;
- 3) венозное;
- 4) артериальное.

3. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь тёмно-красная, бордовая, вытекает из раны?

- 1) капиллярное;
- 2) венозное;
- 3) артериальное;
- 4) паренхиматозное.

4. Для остановки венозного кровотечения необходимо:

- 1) наложить на кровоточащий участок марлю;
- 2) наложить на кровоточащий участок жгут;
- 3) наложить на кровоточащий участок давящую повязку;
- 4) закрыть рану ватно-марлевой салфеткой.

5. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь ярко-алая, струится из раны?

- 1) капиллярное;
- 2) венозное;
- 3) артериальное;
- 4) паренхиматозное.

6. При кровотечении из конечностей жгут накладывается:

- 1) выше раны;
- 2) на рану;
- 3) ниже раны;
- 4) не имеет значения, выше или ниже.

7. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь смешанного типа, часто наблюдаются тупые боли в животе, деформация грудной клетки, головокружение, рвота?

- 1) капиллярное;
- 2) венозное;
- 3) артериальное;
- 4) паренхиматозное.

8. Максимальное время наложения жгута не должно превышать:

- 1) не должно превышать 1,5 часов;
- 2) не должно превышать 2-х часов;
- 3) не должно превышать 1 часа;
- 4) не должно превышать 50 минут.

9. Потеря какого количества крови считается смертельной?

- 1) 30 процентов;
- 2) 40 процентов;
- 3) 50 процентов;
- 4) 35 процентов.

10. На сколько можно остановить кровотечение?

- 1) 30 минут;
- 2) 120 минут;
- 3) 60 минут;
- 4) зависит от времени года.

11. Что из перечисленного является неправильным действием при оказании первой помощи при капиллярном кровотечении?

- 1) наложить повязку или пластырь;
- 2) вокруг раны обработать спиртовым раствором;
- 3) обеззаразить открытые участки;
- 4) обработать спиртом саму рану.

12. В каком случае жгут наложен правильно?

- 1) пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается;
- 2) конечность ниже жгута бледная;
- 3) конечность ниже жгута синее;
- 4) конечность становится бесчувственной.

13. Максимальное время наложения жгута в холодное время:

- 1) не должно превышать 1,5 часа;
- 2) не должно превышать 1 часа;
- 3) не должно превышать 2 часов;
- 4) не должно превышать 30 минут.

14. Что нужно сделать в первую очередь при артериальном кровотечении?

- 1) наложить на рану повязку;
- 2) обработать участок тела вокруг раны;
- 3) осуществить временную остановку кровотечения, затем наложить кровоостанавливающий жгут;
- 4) наложить на рану давящую стерильную повязку.

15. Что нельзя делать при носовом кровотечении?

- 1) приложить холод на переносицу;
- 2) после спадения кровотечения засунуть турунды, смоченные перекисью, в нос;
- 3) запрокинуть голову вверх;
- 4) обратиться к врачу.

16. Что нельзя делать при артериальном кровотечении?

- 1) сделать пальцевое прижатие артерии;
- 2) наложить жгут на голое тело;
- 3) дать пострадавшему (без аллергии) обезболивающее;
- 4) доставить в больницу.

17. Что нельзя делать при венозном кровотечении?

- 1) произвести сгибание раненой конечности;
- 2) наложить жгут;
- 3) доставить в больницу;
- 4) закрыть жгут одеждой.

18. Что необходимо сделать по истечении 30 минут после наложения жгута?

- 1) ослабить жгут на 10 минут, наложить повторно, но на 2 см выше;
- 2) снять жгут насовсем;
- 3) наложить жгут повторно, на это же место;
- 4) ставить всё как есть.

19. Что называется нарушением целостности кожи, слизистых оболочек с повреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием.

- 1) перелом;
- 2) растяжение;
- 3) рана;
- 4) ушиб.

20. Что называется комплексом мероприятий, направленным на уничтожение микробов на коже, в ране или в организме в целом?

- 1) профилактика;
- 2) асептика;
- 3) гигиена;
- 4) хирургия.

21. Что не надо делать при паренхиматозном кровотечении?

- 1) доставить пострадавшего в больницу;
- 2) положить холод на область предполагаемого кровотечения;
- 3) положить пострадавшего горизонтально с приподнятыми ногами;
- 4) одеть пострадавшего.

22. Что нужно сделать при венозном кровотечении?

- 1) пальцевое прижатие;
- 2) наложить пластырь;
- 3) максимальное сгибание конечности + давящая повязка;
- 4) приложить подорожник.

23. Можно ли поверхность раны при капиллярном кровотечении обрабатывать зеленкой?

- 1) нет;
- 2) да;
- 3) зависит от времени года;
- 4) зависит от самого пострадавшего.

24. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?

- 1) цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание.
- 2) пульс, высокая температура, судороги.
- 3) резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.

25. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

- 1) остановка кровотечения, наложение повязки;
- 2) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения;
- 3) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.