

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ.
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ»

Выберите правильный ответ

1. Фактор риска в возникновении гидраденита

- а) несоблюдение личной гигиены;
- б) тревога по поводу исхода заболевания;
- в) гипервитаминоз;
- г) сухость кожи.

2. В план ухода за пациентом с рожистым воспалением медсестра включит

- а) измерение артериального давления;
- б) измерение суточного диуреза;
- в) УФО пораженного участка кожи;
- г) местные ванночки с раствором перманганата калия.

3. Неотложное независимое действие медсестры при наличии у пациента фурункула в области носогубного треугольника

- а) вскрытие и дренаж гнойника;
- б) применение тепловых процедур;
- в) срочное направление к врачу;
- г) назначение антибиотиков.

4. Психологической проблемой пациента с рожистым воспалением нижней конечности является

- а) боль;
- б) тревога по поводу исхода заболевания;
- в) ограничение движений;
- г) покраснение кожи.

5. Зависимый тип сестринского вмешательства у пациента с гидраденитом

- а) помощь в самоуходе;
- б) применение согревающего компресса;
- в) организация досуга;
- г) контроль приема лекарств.

6. Приоритетная проблема пациента с карбункулом

- а) боль в области карбункула;
- б) бессонница;
- в) тревога о своем состоянии;
- г) ограничение движений в пораженной части тела.

7. Зависимое сестринское вмешательство у пациента с фурункулезом

- а) обучить пациента принципам рационального питания;
- б) обеспечить прием достаточного количества жидкости;
- в) обеспечить тщательную гигиену кожи;
- г) обеспечить проведение антибактериальной терапии.

8. Острую гнойную хирургическую инфекцию чаще всего вызывает

- а) столбнячная палочка;
- б) стафилококк;
- в) стрептококк;
- г) кишечная палочка.

9. Ограниченное скопление гноя в тканях — это

- а) гематома;
- б) флегмона;
- в) абсцесс;
- г) атерома.

10. Гидраденит — это воспаление

- а) лимфатических узлов;
- б) волосяного мешочка и сальной железы;
- в) подкожной клетчатки;
- г) потовых желез.

11. Форма лимфангита

- а) сетчатый;
- б) гематогенный;
- в) эритематозный;
- г) травматический.

12. Местный симптом рожистого воспаления

- а) подергивание мышц;
- б) гиперемия кожи с четкими границами;
- в) разлитое покраснение кожи;
- г) инфильтрация с цианотичным оттенком кожи.

13. Тризм характерен для

- а) фурункулеза;
- б) газовой гангрены;
- в) столбняка;
- г) рожистого воспаления.

14. Лимфаденит — это воспаление

- а) потовых желез;
- б) лимфатических узлов;
- в) лимфатических сосудов;
- г) сальных желез.

15. Острый гематогенный остеомиелит — это воспаление

- а) пальца;
- б) коленного сустава;
- в) костного мозга и кости;
- г) венозных сосудов.

16. При размягчении воспалительного инфильтрата следует

- а) наложить компресс с мазью Вишневского;
- б) наложить пузырь со льдом;
- в) наложить грелку;
- г) произвести широкий разрез и дренирование.

17. Пандактилит — это воспаление

- а) кожи пальца;
- б) сухожильного влагалища;
- в) межфаланговых суставов;
- г) всех тканей пальца.

18. Разлитое воспаление подкожной клетчатки — это

- а) сетчатый лимфангит;
- б) рожистое воспаление;
- в) флегмона;
- г) абсцесс.

19. После вскрытия абсцесса накладывают повязку с

- а) гипертоническим раствором хлорида натрия;
- б) мазью Вишневского;
- в) преднизолоновой мазью;
- г) 3% раствором перекиси водорода.

20. Для лечения серозного мастита применяют

- а) обильное питье;
- б) вскрытие очага инфекции;
- в) инфузионную терапию;
- г) функциональный покой молочной железе.

21. Препарат, применяемый для этиотропной терапии рожистого воспаления

- а) ацетилсалициловая кислота;
- б) мазь Вишневского;
- в) облепиховое масло;
- г) пенициллина натриевая соль.

22. Паронихия — это воспаление

- а) всех тканей пальца;
- б) межфалангового сустава;
- в) сухожильного влагалища;
- г) околоногтевого валика.

23. Форма остеомиелита

- а) эритематозный;
- б) буллезный;
- в) гематогенный;
- г) стволовой.

24. Возбудитель газовой гангрены

- а) синегнойная палочка;
- б) клостридия;
- в) столбнячная палочка;
- г) протей.

25. Осложнение сепсиса

- а) анафилактический шок;
- б) септический шок;
- в) септицемия;
- г) септикопиемия.

26. Тактика медицинской сестры при остром гематогенном остеомиелите

- а) сухое тепло, наблюдение;
- б) антибиотикотерапия в амбулаторных условиях;
- в) иммобилизация, срочная госпитализация;
- г) направление пациента в травмпункт.

27. Хирургическое лечение газовой гангрены

- а) некрэктомия;
- б) секвестрэктомия;
- в) лампасные разрезы;
- г) удаление некротического стержня.

28. Карбункул — это воспаление

- а) лимфатической железы;
- б) одного волосяного мешочка;
- в) потовой железы;
- г) нескольких волосяных мешочков.

29. Местный симптом газовой гангрены

- а) крепитация;
- б) местное повышение температуры;
- в) покраснение кожи без четких границ;
- г) нагноение тканей.

30. Флюктуация — это

- а) появление пузырей на гиперемированной коже;
- б) судорожное сокращение мимических мышц;
- в) размягчение в центре инфильтрата;
- г) «хруст» при пальпации кожи.

31. Симптом, характерный для газовой гангрены

- а) симптом «тугой повязки»;
- б) опистотонус;
- в) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц;

г) стихание болей в ране.

32. Столбнячный анатоксин вводится для

- а) снятия симптомов воспаления;
- б) предупреждения сепсиса;
- в) создания активного иммунитета;
- г) создания пассивного иммунитета.

33. Для внутрикожной пробы применяется противостолбнячная сыворотка в разведении

- а) 1:500
- б) 1:1000
- в) 1:100
- г) 1:10

34. Внутрикожная проба при введении противостолбнячной сыворотки считается отрицательной, если

- а) диаметр папулы менее 1 см, ограниченная гиперемия;
- б) диаметр папулы 1 см, разлитая гиперемия;
- в) диаметр папулы более 1 см, гиперемии нет;
- г) папула более 1 см, разлитая гиперемия.

35. При воспалительном процессе в стадии инфильтрации показана антибактериальная терапия и

- а) повязка с гипертоническим раствором хлорида натрия;
- б) физиотерапия;
- в) вскрытие инфильтрата;
- г) пункция инфильтрата.

36. Удаление некротического стержня является методом лечения

- а) абсцесса;
- б) фурункула;
- в) гидраденита;
- г) лимфаденита.

37. Методы экстракорпоральной детоксикации применяют при лечении

- а) сепсиса;
- б) лимфангита;
- в) тромбофлебита;
- г) гидраденита.

38. Возбудителем рожистого воспаления является

- а) стафилококк;
- б) стрептококк;
- в) синегнойная палочка;
- г) энтерококк.

39. Форма рожистого воспаления кожи

- а) узловая;
- б) эритематозная;
- в) абсцедирующая;
- г) инфильтративная.

40. Гематогенный остеомиелит может быть следствием

- а) огнестрельного ранения;
- б) открытого перелома;
- в) закрытого перелома;
- г) флегмоны забрюшинного пространства.

41. Основной метод хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита — это

- а) остеоперфорация;
- б) остеосинтез;
- в) скелетное вытяжение;
- г) ампутация.

42. Гидраденит чаще локализуется в

- а) подмышечной ямке;
- б) паховой складке;
- в) области шеи;
- г) области спины.

43. Мастит – это воспаление

- а) лимфатического узла;
- б) лимфатического сосуда;
- в) молочной железы;
- г) сальной железы.

44 . Лечение абсцесса в стадии инфильтрации

- а) антибиотикотерапия с физиотерапией;
- б) широкий разрез и дренирование раны;
- в) пункция гнойника с введением антибиотиков;
- г) инфузионная терапия.

45. Цвет кожи при газовой гангрене

- а) гиперемированная;
- б) бледная с желтушными пятнами;
- в) нормальной окраски;
- г) бледная с мраморным рисунком.