

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ. СЕСТРИНСКАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ»**

Выберите правильный ответ

1. Приоритетная проблема пациента с облитерирующим эндартериитом

- а) трофические нарушения кожи конечностей;
- б) отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы пораженной конечности;
- в) боль в конечности;
- г) зябкость дистальных отделов конечности.

2. Компонент плана ухода за пациентом с острым тромбофлебитом

- а) обучение методам самомассажа пораженного отдела конечности;
- б) обучение элементам лечебной физкультуры;
- в) обеспечение пациента эластичным бинтом;
- г) обеспечение максимально комфортных условий для соблюдения постельного режима.

3. Симптом, характерный для облитерирующего эндартериита в начале заболевания

- а) исчезновение пульса на периферической артерии;
- б) отсутствие болей;
- в) гиперемия;
- г) жжение и покалывание в пальцах стоп.

4. Долгосрочная цель в плане сестринского ухода за пациентом с облитерирующим эндартериитом

- а) отказ от курения;
- б) полное восстановление физической активности;
- в) уменьшение зябкости конечностей;
- г) полное восстановление пульсации на мелких артериях стоп.

5. Сухая гангрена чаще развивается при

- а) медленно прогрессирующем нарушении кровообращения;
- б) остром нарушении кровообращения;
- в) бурном развитии инфекции в тканях;
- г) повреждении нервных стволов.

6. Симптомы интоксикации более выражены при

- а) сухой гангрене;
- б) пролежнях;
- в) влажной гангрене;
- г) трофической язве.

7. При сухой гангрене происходит

- а) нарастающий отек тканей;
- б) гнилостный распад тканей;
- в) мумифицирование тканей;
- г) газообразование в тканях.

8. Осложнение влажной гангрены

- а) анафилактический шок;
- б) сепсис;
- в) острая церебральная недостаточность;
- г) острая дыхательная недостаточность.

9. Операция при сухой гангрене

- а) может быть отложена до полного отграничения некротических тканей;
- б) должна быть произведена немедленно;
- в) не показана, ткани отторгаются самостоятельно;
- г) может быть отложена до появления симптомов нарастающей интоксикации.

10. Во время беременности наиболее часто встречается сосудистая патология

- а) атеросклероз;

- б) облитерирующий эндартериит;
- в) варикозное расширение вен;
- г) острый тромбоз артерии.

11. Условие, способствующее образованию язв

- а) нарушение обмена электролитов;
- б) неполноценное питание;
- в) нарушение периферического кровообращения;
- г) нагноительные процессы.

12. Обработку кожи для профилактики пролежней производят

- а) 10% нашатырным спиртом;
- б) 96% этанолом;
- в) 3% перекисью водорода;
- г) 10% камфорным спиртом.

13. Наиболее частая причина образования свищей

- а) пороки развития;
- б) оперативное вмешательство;
- в) хронический воспалительный процесс;
- г) травматические повреждения.

14. Наружный свищ мягких тканей соединяет

- а) очаг инфекции с внешней средой;
- б) орган с мягкими тканями;
- в) орган с полостью тела;
- г) органы между собой.

15. Фактор, препятствующий развитию грануляций в свищевом ходе

- а) нарушение кровообращения в окружающих тканях;
- б) действие химически активных секретов;
- в) снижение реактивности организма;
- г) нерациональное питание пациента.

16. Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей

- а) кровотечение;
- б) перемежающаяся хромота;
- в) сухая гангрена;
- г) отек тканей.

17. Препарат, применяемый для лечения тромбофлебита

- а) но-шпа;
- б) никотиновая кислота;
- в) тромбин;
- г) троксевазин.

18. Характерный симптом облитерирующего эндартериита

- а) нарастающий отек тканей;
- б) гиперемия кожи;
- в) исчезновение периферического пульса;
- г) общее повышение температуры.

19. Перемежающаяся хромота — основной признак

- а) лимфангита;
- б) облитерирующего эндартериита;
- в) варикозного расширения вен нижних конечностей;
- г) лимфостаза в нижних конечностях.